Documento aggiornato al: 17/10/2025, 19:04. CREA/SNCV ©2011-2025.



CRA-VIT Centro di Ricerca per la Viticoltura, Conegliano (TV);

ERSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia

**Iscrizione al registro nazionale delle varietà di vite** G.U. n. 242 del 15/10/1991

**Origine** Ruda (UD)

### CAMPO DI OMOLOGAZIONE E CONFRONTO

Ubicazione Buttrio (UD); Spilimbergo (PN)

Forma di allevamento

Densità di impianto (ceppi/ha)

2100

Periodo di osservazione

1986-1988

#### CARATTERISTICHE DISTINTIVE RISPETTO ALLA MEDIA DELLA POPOLAZIONE

- ✓ Buona fertilità delle gemme basali
- ✓ Produttività inferiore

FASE	<b>EPOCA</b>
FENOLOGICA	
Germogliamento	III decade Aprile
Fioritura	I decade Giugno
Invaiatura	I decade Agosto
Maturazione	II decade Settembre

### IL GRAPPOLO

- M Grappolo piccolo, cilindrico, corto
- Acino piccolo, rotondeggiante; a maturazione tende ad assumere una colorazione giallo-dorata





# SUSCETTIBILITÀ MALATTIE CLONE CRITTOGAMICHE (%)

Botrite	-
Oidio	

CARATTERISTICHE	CLONE
PRODUTTIVE	
Fertilità potenziale delle gemme	1,67
Produzione per ceppo (Kg)	4,7
Numero grappoli/ceppo	60,6
Peso medio grappolo (g)	77,6
Peso medio acino (g)	-
Peso legno potatura (g/ceppo)	-
Indice di Ravaz	-

	Parametri	CLONE
	<b>ENOCHIMICI</b>	
	Zuccheri (°Brix)	19,75
9	рН	3,18
MOSTO	Acidità totale (g/l)	7,5
M	Ac. Tartarico (g/l)	-
	Ac. Malico (g/l)	-

## ANALISI SENSORIALE

### **DESCRIZIONE ORGANOLETTICA**

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; snello, asciutto, elegante ed acidulo; aroma molto intenso, complesso e caratteristico. Di ottima qualità.

Da utilizzare come clone complementare miglioratore per vini da invecchiamento.

